

LYMPHOMES NON HODGKINIENS

Chimiothérapie lymphome folliculaire	
N° protocole	FL-2000
Promoteur	Intergroupe folliculaire GELA-GOELAMS Service Hémato CHU Lyon Sud 69495 Perre-Bénite Cedex France
Titre protocole	Protocole FL-2000 pour les patients de tous âge avec un lymphome folliculaire de forte masse tumorale
Phase	rando bras A-) CHVP+roféron bras B -) CHVP+roféron+rituximab
Date accord Comité d'Ethique	09/05/2000
Date fin étude	En cours

Traitements des LNH en fonction de la classification des patients (âge-phénotype tumoral-score facteurs) -) 8groupes

N° protocole	LNH 98 4è protocole		
Promoteur	GELA		
Titre protocole	8 groupes-8traitements	Phénotype B	0 facteur LNH98-1 ACVB 1 facteur LNH98-2 si bcl2 positif -) ACVBP-auto si bcl2 négatif -) ACVBP-conso 2-3 facteurs LN98-3 ACVBP vsACE auto avec ou sans rituximab
		Phénotype T anaplasique	0 facteur LNH98-1 ACVBP 1 facteur ACVBP 2-3 facteurs ACVBP auto
		Phénotype T non-anaplasique	0 facteur LNH98-1 1-3 facteurs LNH98-7
Date accord Comité d'Ethique	06/02/98		
Date fin étude	En cours		

Lymphome gastrique de faible degré de malignité	
N° protocole	
Promoteur	UKLG-GELA
Titre protocole	Etude randomisée : abstention thérapeutique versus chlorambucil après éradication de l'hélicobacter pylori.
Phase III	rando bras A-) Eradication hélicobacter puis abstention bras B -) Eradication hélicobacter puis chorambucil
Date accord Comité d'Ethique	04/05/1996
Date fin étude	En cours