

## Ovaires

<b>Chimiothérapie séquentielle hautes doses + PBPC versus schéma standard 1ère ligne ovaire III ou IV</b>	
<b>N° Protocole</b>	OVCAT
<b>Promoteur</b>	EBMT
<b>Titre protocole</b>	A randomized phase III trial of sequential high dose chemotherapy or standard chemotherapy for optimally debulked FIGO stage II ad IV ovarian cancer
<b>Phase</b>	phase III randomisée bras A-)cycle1 Taxol200mg/m2 en 3h - cyclo 3g/m2 en 2h avec 1,5g Mesna + G-CSF+cyta cycle2 Taxol 200mg/m2 en 3h -cyclo 3g/m2 en 2h avec 1,5g Mesna + G-CSF+cyta si néc cycle3 Taxol 200mg/m2 en 3h- carbo AUC20 en 4h+ PBPC 72h après+ G-CSF cycle4 idem cycle5 Taxol j1 -)200mg/m2 en 3h-Carbo AUC20 en 4h et j2 -) Melphalan 140mg/m2 en 15' + G-CSF bras B-) Taxol 175mg/m2 en 3h + Carbo AUC5 / 3sem pdt 6cycles
<b>Date accord Comité d'Ethique</b>	protocole et amendements 1-2 -)26/10/1999
<b>Date fin étude</b>	